



CimoSkin

Hände-/Hautdesinfektionsmittel 2-Propanol 70% (V/V)

Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühllumschläge.

Art der Anwendung

Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Hygienische Händedesinfektion bakterizid und levurozid	konz. 30 Sek. *	VAH/DGHM, EN 1500
Chirurgische Händedesinfektion bakterizid und levurozid	konz. 1,5 Min. *	VAH/DGHM, EN 12791
Hygienische Händedesinfektion	konz. 30 Sek. *	IfSG § 18, RKI-Liste Bereich A
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek. *	VAH/DGHM
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek. **	DVW/RKI-Leitlinie
Rotaviren	konz. 15 Sek. **	DVW
Hautdesinfektion talgdrüsenarmer Haut vor Injektionen, Punktionen peripherer Gefäße vor Operationen, Punktionen von Gelenken	konz. 15 Sek. * konz. 1 Min. *	VAH/DGHM VAH/DGHM
Hautdesinfektion talgdrüsenreicher Haut	konz. 10 Min. *	VAH/DGHM
Kühllumschläge	1 : 1 mit Wasser verdünnen	

* Die sauberen, trockenen Hände/Unterarme/Hautbereiche müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konz. Produkt feucht gehalten werden.
**Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Besonders hautverträglich
- IHO-gelistet
- VAH-gelistet
- RKI-gelistet
- HACCP-konform

Gegenanzeigen

Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Beim Einreiben in die Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Technische Informationen

Karton mit 20 Fl. à 150 ml Art.-Nr. 20556
 Karton mit 9 Pumpsprayfl. à 250 ml Art.-Nr. 00566
 Karton mit 20 Eurofl. à 500 ml Art.-Nr. 20562
 Karton mit 10 Euro-Fl. à 1.000 ml Art.-Nr. 00567

Zubehör

Spender manuell EURO 500 ml Art.-Nr. 80058
 Spender manuell EURO 1.000 ml Art.-Nr. 80054
 Dispenser für Spenderfl. EURO
 à 500/1.000 ml Art.-Nr. 94787

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil:
 2-Propanol 63,1 g; sonstiger Bestandteil: gereinigtes
 Wasser.

Zul.-Nr.: 1599.98.99;

Halbbarkeit nach Anbruch 6 Monate.

CimoSkin ist in Deutschland als Arzneimittel zugelassen und daher von der Kennzeichnungspflicht nach Gefahrstoffrecht ausgenommen.

Hinweise

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. CimoSkin wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Warnhinweise

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Stand der Information: 07/2022

© 1022

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE